Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Malakologische Fauna der gräfl. Egger'schen Herrschaft St. Georgen am Längsee.

Von Dr. S. Ressmann.

Die Herrschaft St. Georgen am Längsee, gegenwärtig im Besitz des Herrn Grafen Gustav von Egger befindlich, umschliesst in einem Gebiet von etwa 15 Quadratkilometer soviel interessante Conchylienarten, dass deren Zusammenstellung wohl von Interesse sein dürfte. Die in der Aufzählung genannten Fundorte sind: der Magdalensberg bei Hochosterwitz, 1130 Meter hoch, Urschiefer; — der Odwinskogel bei St. Georgen, 819 Meter hoch, Uebergangskalk, das Kreiger Schlösschen, 830 Meter hoch, Urschiefer, Liebenfels, 748 Meter auf Urschiefer, Treibach, 682 Meter auf Kreidemergel und Rosenbichl, 622 Meter auf Urschiefer.

Die von mir seit vielen Jahren daselbst aufgefundenen Arten sind:

Vitrina elongata Drap. Magdalensberg.
— pellucida Müll. St. Georgen.
— diaphana Drap. „
Hyalina cellaria Müll. St. Georgen, Magdalensberg.
— nitens Mich. St. Georgen, Polling, Rothenstein.
— nitidula Drap. St. Georgen.
— crystallina Müll. „
Hyalina hyalina Fér. Magdalensberg.
— nitidosa Fér. St. Georgen, Magdalensberg.
— fulva Müll. „
Zonites verticillus Fér. Magdalensberg, Monsberg.
Helix rupestris Drap. Ueberall häufig.
— pygmaea Drap. St. Georgen.
— rotundata Müll. Ueberall.
— ruderata Stud. Treibach.

Helix solaria Menke. Magdalensberg, Hochosterwitz.
— obvoluta Müll. „
— holoserica Stud. St. Georgen, Hochosterwitz.
— personata Lam. „
— unidentata Drap. Magdalensberg, Treibach.
— edentula Drap. Monsberg.
— leucozona Ziegl. Treibach.
— hispida L. St. Georgen.
— sericea Drp. St. Georgen, Launsdorf.
— strigella Drp. St. Georgen, Stadelhoff.
— fruticum Müll. Magdalensberg.
— incarnata Müll. Häufig.
— umbrosa Partsch. Oellach.
— pulchella Müll. St. Georgen.
— costata Müll. St. Georgen, Fresendorf, Rothenstein.
— aculeata Müll. Treibach.
— obvia Hartm., St. Georgen.
— planospira Lam. Magdalensberg, Kreigerschlösser.
— foetens C. Pfr. Kreigerschlösser, Triesach.
— arbustorum L. Häufig.
var. alpestris Ziegl. Gurkbrücke bei Treibach.
— austriaca Mühlf. St. Georgen.
— nemoralis L. Häufig.
— pomatia L. Ueberall.
Bulimus montanus Drap. St. Georgen, Magdalensberg, Kreigerschlösser.
— obscurus Drap. Häufig.
— tridens Müll. Magdalensberg, Rosenbichl.
Cionella lubrica Müll. Gemein.
— nitens Kokeil. St. Georgen.
— acicula Müll. Hochosterwitz.
Pupa frumentum Drap. Häufig.
— dolium Mich. Gemein.
— gularis Rossm. Rothenstein, Magdalensberg.

Pupa doliolum Brug. Magdalensberg.
— truncatella Pfr. Häufig.
— pagodula Desm. Magdalensberg, St. Georgen, Rothenstein.
— muscorum L. Magdalensberg, St. Georgen.
— minutissima Hartm., St. Georgen.
Vertigo laevigata Kokeil (ventrosa Heyn.) St. Georgen.
— antivertigo Drp. St. Georgen.
— pygmaea Drp. „
— pusilla Müll. „
— angustior Jeffr. „
Clausilia laminata Mtg. Ueberall.
— ungulata Zgl. Kreigerschlösser.
— fimbriata Zgl., „ Magdalensberg.
— cerata Rossm. Hochosterwitz.
— ventricosa Drp. Launsdorf, St. Georgen, Oellach.
— densestriata Zgl. Hochosterwitz, Kreigerschlösser.
— plicatula Drp. Gemein.
— Eggeri Ffld. Magdalensberg.
— attenuata Zgl. Hochosterwitz.
— mucida Zgl. Magdalensberg, St. Georgen.
— parvula Stud. Kreigerschlösser.
— filograna Ziegl. Häufig.
Balea fragilis Drp. Liebenfels, Hochosterwitz.
Carychium minimum Müll. Gemein.
Acme lineata Drp. St Georgen.
Pomatias maculatum Drp. Häufig.
Succinea putris L. Häufig.
— bullina Fér. Simming-Weiher.
— Pfeifferi Rossm. Launsdorf, Simmning.
Limnaea palustris Müll. Thalsdorf.
— fusca Pfr. Nadelhoff.
— peregra Müll. Gemein.
— truncatula Müll. St. Georgen.

Limnaea auricularia Drp. St. Georgen.
— vulgaris C. Pfr. Launsdorf.
Physa hypnorum L. Nadelhoff.
Planorbis marginatus Drp. St. Georgen, Nadelhoff.
— albus Müll. St. Georgen, Rosenbichl.
— spirorbis Müll. Nadelhoff, „
— contortus Müll. „ „
— nitidus Müll. „ „
Ancylus fluviatilis Müll. Simming.
— lacustris Drp. Oellach.
Paludina vivipara Drp. St. Georgen.
Bithynia tentaculata L. „
Hydrobia viridula Kok. Simming.
Valvata piscinalis Müll. St. Georgen.
— contorta Menke. „
Anodonta cellensis Schr. „
— latissima Kokeil. „
Cyclas cornea Drp. Treibach. Gurk.
Pisidium fontinale C. Pfr. Treibach, Rosenbichl, Gurk, Simming.

Eine neue transcaucasische Clausilie.

Clausilia acrolepta sp. n.

Testa breviter rimata, ventricose fusiformis, confertim striatula, subsericea, flavidofusca; spira valde attenuata, prope apicem gracilis; anfr. 11, primi tres subaequales, laeves, sequentes convexiusculi, sutura simplici sat profunda divisi, penultimus ventricosus, ultimus distanter ruguloso costulatus, basi leviter bigibbosus, gibbere inferiore subcristaeformi; apertura parva, late piriformis, peristoma continuum, breviter solutum, vix expansum, crassiusculum, flavido-album; lamella superior et inferior parvae, illa marginem attingens; lunella conspicua;